

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA – CURIOSIN® GELS

KAS IR CURIOSIN® gels?

CURIOSIN® ir caurspīdīgs brūču un ādas gels bez smaržas, kas neatstāj traipus uz ādas un drēbēm. CURIOSIN® satur galvenokārt cinka hialuronātu. Tas satur arī karbomēru (gelu veidojošu vielu), kālija sorbātu (konservantu), attīrītu ūdeni, un tā mikrobioloģiskā tīrība atbilst Eiropas farmakopejas prasībām.

CURIOSIN® gels ir pieejams dažāda tilpuma tūbiņās (15 g; 30 g; 50 g).

Galvenā CURIOSIN® sastāvdaļa hialuronāns ir svarīga ādas un saistaudu sastāvdaļa, kas nodrošina tās viendabīgumu un reģenerāciju pēc traumas. Cinka hialuronātam kā hialuronāna kompleksam ir papildus labvēlīga iedarbība.

CURIOSIN® palīdz bojātai ādai primārā vai sekundārā veidā: nodrošina nepieciešamo mikrovidi, aizkavē ārējās vides (ar gaisu pārnēsātu vai kontaktilmes) mikroorganismu piekļūšanu bojātas ādas virsmai, kā arī palīdz samazināt ādas bojājumu, remdēt sāpes un audu iekaisumu. Bez tam preparāts palīdz atjaunot bojāto ādu tās dabiskā stāvoklī un izskatā.

LIETOŠANAS MĒRĶIS

Bojātas vai problemātiskas ādas aizsardzība un ārstēšana, kā arī akūtu un hronisku brūču dzīšanas veicināšana.

Lietošana sadzīvē

- Bojāta āda (piemēram, radiācijas izraisīts kairinājums, ādas sausums, lobīšanās).
- Virspusējas brūces, piemēram, nelielas traumatiskas brūces (nobrāzumi, plēstas brūces, iegriezumi), nelieli apdegumi (pirmās un otrās pakāpes).
- Vieglas līdz vidējas pakāpes *acne vulgaris*.

Veselības aprūpes speciālista uzraudzībā

- Hroniskas brūces, piemēram, dažādas izcelsmes čūlas uz kājām un izgulējumi.
- Ķirurģiskas brūces (slēgtas, neinficētas)/pēcoperācijas brūces (griezuma) aprūpe.

KĀ LIETOT CURIOSIN®?

CURIOSIN® domāts tikai lokālai lietošanai!

Bojāta vai problemātiska āda

Notīriet ādas virsmu ar ūdeni un uzklājiet CURIOSIN® plānā slānī. CURIOSIN® var lietot atkārtoti.

Nelielas traumatiskas brūces

Notīriet brūces virsmu ar fizioloģisko šķīdumu vai ūdeni, sagaidiet asiņošanas apstāšanos un uzklājiet CURIOSIN® 1 mm plānā slānī visai brūces virsmai. Pēc izvēles varat brūci pārsiet, vai ļaut CURIOSIN® nožūt uz ādas virsmas, vai arī pārklāt brūci ar primāru nepielīpošas marles pārsēju un leikoplastu.

CURIOSIN® var lietot atkārtoti.

Nelieli apdegumi

Atdzesējiet apdegušo virsmu ar aukstu tekošu ūdeni un uzklājiet CURIOSIN®, kā augstāk norādīts.

Hroniskas brūces (kā kāju, nospieduma, diabētiskās čūlas u.c.) un ķirurģiskas (slēgtas, neinficētas) brūces

Pirms sākat lietot CURIOSIN® hronisku un ķirurģisku (slēgtu, neinficētu) brūču ārstēšanai, konsultējieties ar veselības aprūpes speciālistu. Hroniskas brūces jāārstē veselības aprūpes speciālista uzraudzībā, kurš Jums pastāstīs par citiem brūci izraisošās slimības kompleksās ārstēšanas elementiem (piemēram, kompresijas bandāžu, spiediena samazināšanas līdzekļiem, glikozes līmeņa kontroli asinīs, infekcijas kontroli). Ķirurģiskas brūces ārstēšanu var sākt, ja brūce ir slēgta un nav inficēta. Veselības ap rūpes speciālistam jāattīra brūce no bojā gājušiem audiem (ja nepieciešams), jānotīra ārstējamais ādas rajons, viegli noskalojot to ar fizioloģisko šķīdumu vai ūdeni un jāgaida, kamēr asiņošana apstāsies.

Kad brūces vieta ir pienācīgi sagatavota, jārikojas, kā augstāk norādīts. Sekojiet veselības aprūpes speciālista norādījumiem par brūces nasegšanu.

KĀDAS BLAKUSPARĀDĪBAS VAR IZRAISĪT CURIOSIN®?

Lietošanas sākumā dažkārt var būt šādi simptomi: apsārtums, vieglas pārejošas dzelošas sāpes un dedzinošas sajūtas, un vietējas sāpes. Konsultējieties ar veselības aprūpes speciālistu, ja parādās kāds negaidīts simptoms; ja novērojat nepārtrauktu kairinājumu, apsārtumu, iekaisumu; ja parādās infekcijas pazīmes; ja pēc dažām dienām brūce neuzrāda dzīšanas pazīmes.

Klīnisko pētījumu laikā ir bijuši ļoti reti ziņojumi par hipergranulāciju un daļēju nekrozi vienīgi ļoti ierobežotā brūces gultnes rajonā, bet cēloniska sakarība ar CURIOSIN® terapiju netika konstatēta.

KAD NELIETOT CURIOSIN®?

Jūs nedrīkstat lietot CURIOSIN®, ja Jums ir zināma paaugstināta jutība pret kādu no CURIOSIN® sastāvdaļām vai putnu (mājputnu) olbaltumvielām.

DAŽĀDI NORĀDĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā no 5 °C līdz 30 °C. Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā. Pirms pirmās lietošanas reizes pārbaudiet, vai vāciņš ir neskarts. Cieši aiztaisiet pēc katras lietošanas reizes.

Tūbas vāciņš nedrīkst nonākt saskarē ar brūci vai kādu citu virsmu un lietošanas laikā jā rūpējas, lai izvairītos no cita iespējama mikrobu izcelsmes piesārņojuma vai bojājuma. CURIOSIN® ir pieejams dažāda tilpuma tūbiņās. Viens iepakojums paredzēts tikai vienam pacientam.

Nelietot pēc derīguma termiņa.

Izmetiet tūbiņu 4 nedēļas pēc pirmās atvēršanas.

RAŽOTĀJS

Gedeon Richter Plc. 1103 Budapest, Gyömrői út 19-21, Ungārija

Sagatavošanas datums/Lietošanas instrukcijas pārskatīšanas datums

2023. gada aprīlis

Eiropas patents: EP 0 964 687

Simboli:

	Uzmanību! Skatīt lietošanas instrukciju.
	Sēr.
	Der. līdz (mēnesis/gads)
	Temperatūras ierobežojums
	Ražotājs
	Skatīt lietošanas instrukciju
	Nelietot, ja iepakojums bojāts